

HiPP BIO COMBIOTIK®

Odporność zaczyna się
w brzuszku

PRAEBIOTIK® + PROBIOTIK®
z Complex Immuno



**Zdrowa mikrobiota
jelitowa**



**Silny układ
odpornościowy**



Mniej infekcji

**HiPP BIO COMBIOTIK® z synbiotycznym połączeniem
L. fermentum CECT 5716 i galaktooligosacharydami
(GOS) wspiera rozwój zdrowej mikrobioty jelitowej.¹⁻³**

Sprawdzony prebiotyk GOS* z laktozy

Naturalny probiotyk *L. fermentum* CECT 5716
pierwotnie pozyskany z mleka matki⁴⁻⁶**



Mleko dla niemowląt HiPP BIO COMBIOTIK® zawiera również: Metafolin®***, kwasy DHA, ALA i odpowiednio niską zawartość białka (<2g/100 kcal).

**HiPP BIO COMBIOTIK® z *L. fermentum* CECT 5716 i GOS to synbiotyczne
mleko modyfikowane dla niemowląt niekarmionych piersią.**

Complex Immuno: HiPP 2 BIO COMBIOTIK® zgodnie z przepisami prawa zawiera cynk, żelazo, witaminy: A, C, D — dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. **PROBIOTIK®:** Naturalne kultury bakterii kwasu mlekowego.

* Galaktooligosacharydy ** Naturalne kultury bakterii kwasu mlekowego: *Limosilactobacillus fermentum* CECT 5716. Mleko matki zawiera wiele różnych kultur bakterii probiotycznych — ich rodzaj jest cechą indywidualną każdej kobiety. *** Metafolin® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy.


Materiał przeznaczony dla pracowników ochrony zdrowia.

HiPP BIO COMBIOTIK®

— odporność zaczyna się w brzuszku


Zdrowa mikrobiota jelitowa

- zwiększona kolonizacja jelit korzystnymi bakteriami — *Bifidobacterium* o 70% i *Lactobacillus* o 78%¹
- mikrobiota jelitowa podobna do tej u niemowląt karmionych piersią⁷




Silny układ odpornościowy

Dzięki GOS i *L. fermentum* CECT 5716, HiPP BIO COMBIOTIK® zwiększa poziom wydzielniczej IgA w stolcu o 38% po 12 miesiącach w porównaniu z grupą kontrolną.³



Mniejsze ryzyko infekcji

Zmniejsza ryzyko infekcji przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.^{1,2,3}



Ważna informacja: Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Podawanie preparatów do początkowego żywienia niemowląt powinno odbywać się wyłącznie za zgodą pediatry, położnej lub innego niezależnego eksperta.

¹ Maldonado J et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012; 54(1): 55–61. ² Gil-Campos M et al. Pharmacol Res 2012; 65(2): 231–238. ³ Piloquet et al. Am J Clin Nutr 2024; 119(5):1259–1269. ⁴ Martin R et al. J Pediatr 2003; 143(6): 754–758. ⁵ Martin R et al. J Hum Lact 2005; 21(1): 8–17. ⁶ Lara-Villoslada F et al. Br J Nutr 2007; 98(suppl 1): 96–100. ⁷ Lagkouvardos I et al. Am J Clin Nutr 2023; 117 (2): 326–339.



HiPP Expert

Portal specjalistyczny dla lekarzy i położnych.

- bezpłatne webinary
- wykłady z Konferencji Naukowych HiPP
- badania HiPP
- ciekawe artykuły
- Natal Serwis – Magazyn dla Pielęgniarek i Położnych (wersja interaktywna)
- materiały edukacyjne dla rodziców

Zarejestruj się na hippexpert.hipp.pl

Odwiedź nas na:

